

# BOLLETTINO

dei

## Musei di Zoologia ed Anatomia comparata

della R. Università di Torino

---

N. 50 pubblicato il 30 Novembre 1888

VOL. III

---

DR. DANIELE ROSA.

### LOMBRICHI della Birmania, del Tenasserim e dello Scioa.

(RIASSUNTO)

Le nuove forme di Lombrichi, di cui saranno qui accennati i caratteri più importanti, sono state da me descritte estesamente nelle due seguenti pubblicazioni:

1° *Viaggio di Leonardo Fea in Birmania e regioni vicine.* — V. *Perichetidi*, in *Annali del Museo Civico di Genova*, ser. 2°, vol. VI, 1888, pag. 155-167, tav. III.

2° *Lombrichi dello Scioa.* *Ibidem*, pag. 571-592, tav. IX.

#### **Teleudrilus Ragazii** n. g., n. sp.

Questo nuovo genere, affinissimo agli *Eudrilus*, si distingue già esternamente da tutti gli oligocheti conosciuti per avere una sola apertura maschile mediana (al 19° segmento); è pure impari (all'intersegmento 13-14) l'apertura delle spermateche, mentre le aperture femminee sono pari e collocate, come negli *Eudrilus*, sulla serie dorsale di setole (al 15° segmento); il clitello è completo ed occupa i segmenti (14-17) = 4; le setole sono distanti sebbene ancora geminate. Le disposizioni interne singolarissime sono descritte nel 2° dei citati lavori.

**Hab.** Let-Marefia nello Scioa (D' V. Ragazzi).

#### **Acanthodrilus scioanus** n. sp.

È una specie a due ventrigli, come gli *A. Buttihoferi* e *Beddardii* di Horst; è lungo 60-70<sup>mm</sup>, ha setole geminate, clitello ai segmenti (13-19), aperture maschili ai segmenti 17 e 19 — setole peniali lisce e quasi

dritte, spermateche con un diverticolo, non munite di ghiandole accessorie nè di setole copulatrici.

**Hab.** Let-Marefia (D' Ragazzi).

### **Perichaeta Feae.**

Lunghezza sino a 36 cent.; colore sopra quasi nero; inferiormente bianco, con clitello tutto nerastro; setole circa 100 per segmento in ciclo completo; clitello ai segmenti 14, 15, 16; aperture maschili su papille piatte al 18° segmento; non papille accessorie; apertura femminile impari; quattro paia di spermateche munite di lungo cieco a zig-zag; esistono due ciechi intestinali.

**Hab.** Kokareet nel Tenasserim (L. Fea).

### **Perichaeta birmanica** n. sp.

Lunghezza 13 cm.; setole 70 per segmento in circolo completo; clitello ai segmenti 14, 15, 16; aperture maschili su areole al 18° segmento; mancano papille copulatrici; aperture femminee impari; spermateche in tre paia, con un cieco in forma di sacco pedunculato contenente un tubo circonvoluto.

**Hab.** Bhamò nell'Alto Irawaddi (L. Fea).

Nel 1° dei citati lavori sono inoltre descritti il *Megascolex armatus* (Beddard) su esemplari presi dal Fea a Mandalay, ed il *Perionyx excavatus* (Perrier) sugli esemplari raccolti dallo stesso a Bhamò (Alto Irawaddi) e Meetan (Tenasserim).

Devo questi materiali al sig. Marchese Giacomo Doria, direttore del Museo Civico di Genova.

