

Istituto anatomico di Torino, diretto dal Prof. C. GIACOMINI.

SULLA PRESENZA DI CELLULE GANGLIONARI SUL
DECORSO DELLE FIBRE CHE COMPONGONO I
NERVI *SPLANCHNICUS MAJOR ET MINOR*. —

Comunicazione preventiva del Dr. G. Sperino, Settore
capo, libero Docente di anatomia topografica.

Ho istituito delle ricerche per conoscere l'intima struttura dei nervi *splanchnicus major et minor*, ed ho constatato che essi presentano sul loro decorso numerose cellule ganglionari, parte isolate, parte riunite a gruppi, disposte frammezzo alle fibre nervose.

Avvertasi che non intendo alludere a quel piccolo ganglio che trovasi sul grande splanchnico, poco prima che questo attraversi il diaframma, ai lati del capo dell'undecima e più frequentemente della dodicesima vertebra dorsale (Cunningham lo trovò costantemente a destra, ed a sinistra sei volte sopra quindici) stato descritto da Arnold col nome di *ganglio splanchnico*. Le cellule che io ho visto si trovano tanto al di qua come al di là di questo ganglio.

Le mie ricerche finora si riferiscono all'uomo, sia nel feto che nell'adulto, ed a conigli.

Mi riservo di estendere maggiormente queste ricerche per stabilire la frequenza e la topografia di questi elementi mor-

fologici, come pure i loro caratteri istologici, e di comunicare in un lavoro più esteso i risultati di queste ricerche.

Intanto, attesa l'importanza tanto dal lato anatomico, quanto dal lato fisiologico di questo reperto (il quale viene altresì a confermare le cognizioni che attualmente si hanno sullo sviluppo embriologico del gran simpatico), ho creduto opportuno di portarlo a conoscenza degli studiosi, non essendo, per quanto mi consta, questo fatto menzionato dagli autori che si sono occupati con maggior diligenza di questa parte dell'anatomia.

22 gennaio 1886.

Estratto dalla GAZZETTA DEGLI OSPITALI
N. 10, Anno 1886.

Stabilimento dell'Antica Casa Editrice Dott. FRANCESCO VALLARDI.
Milano (Corso Magenta, 48).